

А.А. Даниленко, С.В. Шахтарина

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА ПОСЛЕ ЛУЧЕВОГО И ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ

A.A. Danilenko, S.V. Shakhtarina

Thyroid Abnormalities in Hodgkin's Lymphoma Survivors after Radiotherapy and Chemo-radiotherapy

СОДЕРЖАНИЕ

Лечение лимфомы Ходжкина (лучевое, химическое, химиолучевое) может приводить к формированию ряда патологических состояний щитовидной железы. После лечения у больных лимфомой Ходжкина повышена вероятность развития гипотиреоза, гипертиреоза, незлокачественных узловых образований и рака щитовидной железы. В обзоре представлены данные литературы, отражающие вероятность возникновения осложнений лечения лимфомы Ходжкина со стороны щитовидной железы в зависимости от вида терапии и иных факторов.

Ключевые слова: *лимфома Ходжкина, лучевая терапия, химиолучевая терапия, щитовидная железа*

CONTENTS

Hodgkin's lymphoma treatment (radiotherapy, chemotherapy, chemo-radiotherapy) may lead to a variety of thyroid abnormalities. After Hodgkin's lymphoma treatment, patients have higher probability of hypothyroidism, hyperthyroidism, Grave's disease, thyroid nodules and thyroid cancer. This review contains data on thyroid complications in Hodgkin's lymphoma patients treated either with radiation, drugs or combined modality therapy.

Key words: *Hodgkin's lymphoma, radiotherapy, chemo-radiotherapy, thyroid gland*